

ORIENTAÇÕES

- Este cartão deverá ficar com o paciente até a última dose. Ao finalizar o tratamento, deverá ser anexado ao prontuário do paciente. Em caso de gestante, além do prontuário, uma cópia deve ser anexada ao cartão de gestante;
- A regra é que o intervalo entre as doses seja de **07 DIAS**. No entanto, caso esse intervalo ultrapasse 14 dias, o esquema deve ser reiniciado. Na gestante o intervalo deverá ser no máximo de 9 dias.
- Se gestante, o tratamento deve ser iniciado até 30 dias antes do parto. Caso iniciado 29 dias antes do parto, considera-se tratamento inadequado.



PREFEITURA DE **JOÃO
MONLEVADE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

(31) 3859-5800

**Avenida Getúlio Vargas, 2.640 -
Belmonte, João Monlevade-MG**



PREFEITURA DE **JOÃO
MONLEVADE**

CONTROLE DE APLICAÇÃO DE **BENZETACIL®**

(benzilpenicilina benzatina)

INFORMAÇÕES PESSOAIS

NOME COMPLETO: _____

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: _____

GESTANTE: () SIM DUM: _____ DPP: _____

() NÃO

TRATOU O PARCEIRO: () SIM () NÃO

QUAL A PRESCRIÇÃO:

- () Benzilpenicilina Benzatina - 2,4 milhões UI, IM, dose única.
- () Benzilpenicilina Benzatina - 2,4 milhões UI, IM, 1x/semana, por 3 semana.

LEIA COM ATENÇÃO

PACIENTE

- Observe o prazo de validade do produto a ser aplicado;
- Em caso de dor no local da aplicação, utilizar compressa de água morna;
- Não toque a medicação prescrita sem a orientação do seu médico;
- Em caso de dúvida procure a Secretaria de Saúde.

CONTROLE DE APLICAÇÃO E DATAS

DATA: ____/____/____

DOSE: _____

ASSINATURA: _____

DATA: ____/____/____

DOSE: _____

ASSINATURA: _____

DATA: ____/____/____

DOSE: _____

ASSINATURA: _____

DATA: ____/____/____

DOSE: _____

ASSINATURA: _____

ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO

- Benzetacil® deve ser administrado exclusivamente por via intramuscular profunda.
- O frasco deve ser vigorosamente agitado antes da retirada da dose a ser injetada, para completa homogeneização do produto.
- Desprezar o que não for imediatamente utilizado.
- Recomenda-se injeção intramuscular profunda no quadrante superior lateral da nádega.
- Em lactentes e crianças pequenas, pode ser preferível a face lateral da coxa.
- Para doses repetidas, recomenda-se variar o local da injeção.
- Deve-se evitar a administração em vasos sanguíneos e nervos, ou próximo a estes, uma vez que tais injeções podem provocar lesões neurovasculares e embólicas sérias.